

BRIEFING PHARMACIE

Ceci n'est que le fruit de mon expérience, je n'ai pas la prétention de dire que c'est parfait mais au fil des missions j'ai pu améliorer les conditions de travail à la pharmacie. Mon rôle en arrivant une semaine avant la mission consiste à préparer les malles en fonction des saisons et des itinéraires.

Un inventaire est fait au départ et au retour des missions afin d'ajuster au mieux les quantités de médicaments à mettre dans les cantines.

Pour une grande partie les médicaments sont achetés sur place, les ajouts nécessaires se font en fonction des médicaments apportés par chacun.

Une liste des médicaments à apporter selon possibilité est disponible sur le site d'AR MADA. Si possible noter visiblement les dates de péremption sur les boîtes de médicaments.

Recommandation importante : ne déconditionner pas les boîtes, INGERABLE.

La liste avec les quantités des médicaments pour chaque pathologie est fournie sur chaque itinéraire.

CONSEILS

Garder toutes les bouteilles vides depuis le début de la mission pour la fabrication des chambres d'inhalation

Pour les enfants, couper le fond de la petite bouteille faire une encoche pour la bouche et le nez, recouvrir de sparadrap pour ne pas blesser mettre l'inhalateur dans le goulot faire tenir avec sparadrap.

Pour les adultes faire une encoche sur la grande bouteille du côté du fond y mettre l'inhalateur, faire inspirer expirer par le goulot.

Les bouteilles peuvent être utilisées également pour préparer les solutions SRO en utilisant l'eau du seau hydroclonazée (sûr eau).

LES MALLES

Pour la pharmacie il y a 3 malles médicaments (1, 2 et 3) + une malle pédiatrie (4) + une malle réserve de médicaments (5) et une malle tout venant (6) pour le petit matériel + une valise contenant la barre pèsebébé, rubalise, corde, épingles à linge, rideaux, pèse personne ...

- **MALLE PEDIATRIE**

Classeur avec carnet de santé de l'enfant protocole de renutrition.

Laits et biberons en fonction des stocks.

Boîte avec SRO à faire avec de l'eau du seau ajouter 1 goutte de Sur Eau/1L

Attention sachet de 1 litre ou 200 ml

2 comp de Zinc pendant 15 jours permettent d'éviter les récurrences de diarrhées pendant 6 mois.

Dossier réhydratation

Cirovit sirop vitaminé à partir de 2 ans

Pour les nourrissons Cororange 4 gouttes/jour gouttes vitaminées + du fer

Boîte avec matériel pour préparer la bouillie pour les enfants dénutris en cas de perte de poids ou n'ayant pas pris de poids (recette dans une pochette transparente) à faire en cas de rupture de Koba Aïna

J'ai remplacé le riz par des biscuits car le riz »tourne »avec la chaleur.

Koba Aïna environ 400 sachets rangés dans valise.

Chambres d'inhalation, à ne pas donner car revendues.

ATTENTION , tous les matins prendre les 4 bouteilles d'eau filtrée préparées sur le bateau TSI (hydroclonazone déjà ajouté par les cuisinières) pour la fabrication des antibiotiques et biberons, sur les pangalanes 4 bouteilles d'eau vive en plus des bouteilles personnelles.

- **MALLES MEDICAMENTS**

Afin d'optimiser le rangement des boites dans les malles à la fin des consultations, la liste des boites de médicaments par malle est collée sur le couvercle de chaque malle AINSI QUE LE PLAN DE RANGEMENT.

Chaque boite est étiquetée, il suffit de ranger la boîte de façon à ce que l'étiquette soit visible.

- **RESERVE**

A ne pas oublier, contient la vit C, le kit lavage de mains, les flacons vides et la réserve de médicaments.

- **MALLE TOUT VENANT**

Vidal et pathologies tropicales, classeurs evasan et fiche de suivi, classeur de mission.

thermomètre, piles, agrafeuse, mortier avec pilon, étiquettes, élastiques, gobelets, gel hydroalcoolique, sachets pour médicaments, sachets papier, hydroclonazone, petites cuillères, petits pots pour déconditionner pommad, trousse avec stylos, ciseaux, marqueurs, coupe comprimés, écrase comprimés, calculette, entonnoir...

ORGANISATION DES CONSULTATIONS

Les infirmières se chargent d'installer la « bobologie » quand cela est possible à côté de la dermatologie et demandent aux interprètes 1 ou 2 bassines/seaux.

Si grand effectif d'infirmières une d'entre elles peut aider à l'installation de la pharmacie

Demander seau d'eau + 2 bouchons de sûr eau pour la prise des médicaments par les adultes, prévoir gobelets.

Sortir toutes les boites des malles, installer les boites de pathologies par ordre alphabétique de préférence : AINS, Antalgiques, ...

En cas de manque de matériel sur place (table,banc), se servir des malles comme tréteaux et poser une porte par-dessus.

Si possible prévoir un petit coin pédiatrie avec un banc pour explication bouillie et/ou préparation des biberons (il faut faire un essai avec l'accompagnant).

Lors des conseils donnés pour la diversification de l'alimentation s'aider du carnet de santé enfant pages 14, 15,16 et 17 où tout est en images.

Préparer la bouillie avec l'accompagnant et donner la recette écrite et en images

Préparation des biberons donner les explications et faire préparer par l'accompagnant pour être sûr de la bonne compréhension. De préférence des petites quantités (60 ou 90 ml) car il faut donner en une fois pour une bonne conservation. Tout ceci demande la mobilisation d'un interprète

Attention aux barres et cadenas, remettre les élastiques dans chaque malle car tailles différentes.

Prévoir une table avec tout le matériel utile comme étiquettes, les ciseaux, les élastiques...

Mettre à proximité flacons vides, gobelets, pipettes, seringue, petites cuillères

Lors de la délivrance des médicaments ne pas donner les boîtes et les déchirer avant de les jeter, écrire SERVI sur le carnet et signer.

En cas de médicament manquant préciser si substitution.

Étiqueter les plaquettes avec la posologie, élastiquer plusieurs plaquettes d'un même médicament, mettre les comprimés déconditionnés dans des petits sachets.

Des petits flacons vides sont à disposition dans la cantine réserve pour déconditionner les sirops si besoin ou bien tout liquide (cytéal, ou autre).

Donner systématiquement la 1^{ère} prise sauf pour les antiparasitaires qui ont tendance à donner des nausées qui seront pris de préférence avec le repas du soir.

Donner sur place les prises uniques.

Reconstituer les sirops antibiotiques avec de l'eau filtrée (4 bouteilles par jour prises sur le bateau).

Bien expliquer l'ouverture des bouchons sécurité ou faire sauter la sécurité.

En cas de rupture de sirop Albendazole et Mebex qui sont réservés aux enfants, les comprimés parasito pour les enfants sont dissout dans un peu d'eau et de grenadine et donner avec une pipette.

EXPLICATION DES TRAITEMENTS POUR UNE BONNE OBSERVANCE

A l'attention des prescripteurs dans la mesure du possible, limiter le nombre de médicament et le nombre de prise/jour.

Prise journalière de préférence en 2 fois car la prise du midi est rarement observée

Prescrire de préférence en DCI les médicaments étant achetés sur place génériques

Prescrire en dose poids plus facile à gérer à la pharmacie car tous les dosages sont indiqués sur les couvercles des boîtes

Pour plus de facilité à la pharmacie prescrire AINS, IPP inutile d'indiquer le nom du médicaments car pas trop le choix.

Contraception Pilplan (trinordiol+fer) = pilule locale très facile d'accès 200 ar, et injection assez bien suivie. Implant pas très bien supporté demande fréquente de retrait.

Classeur de fiche de suivi pour les patients à qui il est demandé de revenir à la prochaine mission pour un contrôle. **Préciser sur le carnet** : fiche de suivi faite sur la mission N° x. Si une fiche de suivi est déjà faite, remplir à la suite.

Lors de la délivrance pour plusieurs membres de la famille, identifier à l'aide d'une gommette de couleur différente pour chaque membre sur le carnet, sur chaque médicament et sur la main de l'enfant puis mettre dans un sac papier ou plastique pour chaque membre.

Il est inutile d'indiquer la durée du traitement lors de la délivrance puisque on ne délivre que la quantité nécessaire, également inutile d'indiquer la pathologie (confidentialité)

Les quantités de médicaments à délivrer sont indiquées sur la liste des médicaments pour chaque pathologie

Certains médicaments ne sont QUE dans la malle DERMATO : griséofuline, cloxacilline, préparation Ketoconazole à 2% sachet 5 ml, tube 15 ml ...

Beaucoup de boites se ressemblent la parasito boites vertes , les antibio boites grises. Les antibiotiques pédiatriques souvent 2 dosages même flacon. Bien regarder chaque boite.

Une liste des médicaments dans les malles est à votre disposition avec les quantités à délivrer.

RETOUR DE MISSION

Les cantines médicaments doivent être vidées, les médicaments rangés sur les étagères par spécialité afin de les comptabiliser à l'aide de la feuille inventaire fourni lors du briefing.

Sortir tous les torchons mouillés.

Ne pas laisser de nourriture (bananes...) dans la boite de renutrition, bien fermer le miel ; le sirop ...

Remettre les barres dans les passants des cantines avec le cadenas et la clé. Il y a en tout 4 clés : une pour les malles pharma, une pour les malles IDE, une pour les dermatos et une pour les dentistes.

BONNE MISSION

NADINE