MG préconisations

Dr Nicolas BRETON et Dr Eric DUPRE : médecins référents MG

L'INTÉRÊT EST D' UNIFORMISER NOS PRATIQUES ET DONNER CERTAINES CONDUITES À TENIR AFIN DE PERMETTRE AUX NOUVEAUX ARMADIENS DE GÉRER CERTAINES PATHOLOGIES COURANTES

BECOTIDE ET VENTOLINE

Ces produits sont renouvelés de façon systématique, à des posologies inadaptées et une mauvaise utilisation.

Il y a beaucoup de toux et parfois quelques sibilants ; les patients se plaignent tous d asthme !

Si sibilants récidivants, alors **BECOTIDE** : 1 bouffée par jour maximum

…… **VENTOLINE** : ***1 flacon valable 2 à 3 mois*** ……

Si seulement « toux » STOP on dit que l' on n'en n'a plus : *à revoir à la prochaine mission*

Toute délivrance doit être couplée par un passage à l'infirmerie, pour bien apprendre à utiliser le dispositif

TOUX SÈCHE

Toujours demander si la famille fait le **feu dans la case** ; si oui, leur conseiller de le faire à l'extérieur.

Pour Enfant et Adulte, si pas de fièvre:

- désinfection rhino pharyngée avec eau salée
- vitamines

TENSION

L' INSTAURATION D' UN TRAITEMENT ANTIHYPERTENSEUR NE DOIT ÊTRE EFFECTUÉ QUE SI L'HYPERTENSION EST SYMPTOMATIQUE

PRIVILÉGIER **AMLODIPINE** :

TROIS MESURES EFFECTUÉES CHEZ LES INFIRMIÈRES CONFIRMANT UNE TENSION SUPÉRIEURE À 140/90

En cas de renouvellement de traitement, toujours demander la date de la dernière prise ;

Si celle-ci est supérieure à 3 jours, procéder de la même façon que lors de l'instauration.

- **SYNDROME FONCTIONNEL**

C'est-à-dire pas de pathologie retrouvée ***sauf*** vertiges, céphalées et chaleur

En ce cas **MULTIVITAMINES** pendant 5 jours (effet placébo)

……..pas de FER car cela constipe……..

- **EPILEPSIE**

Les traitements fournis sont **CARBAMAZÉPINE** et **PHÉNOBARBITAL 50 mg**

Il faut prolonger ce traitement dans la mesure du possible,

en fonction des stocks de la pharmacie le jour **J** .

Sinon, les patients peuvent se rendre au CSB le plus proche.

- **CHROMOMYCOSE**

Biopsie pour établir le diagnostic

A la mission d après, traitement de 3 mois de **TERBINAFINE**

Au bout de ces 3 mois , réévaluation photos à l'appui

- Si *amélioration* on continue pour 3 mois, puis STOP
- Si *inefficace* on arrête le traitement

- **ANTIBIOTHÉRAPIE**

Selon les dernières recommandations donner de **3 à 5 jours à dose optimale**

La prescription peut être prolongée si nécessaire

Attention :

- résistance ++ à l'Amoxicilline dans *pneumopathies* à Madagascar

  (sources épidémio 2026)